



交通部路政及道安司 廣告

安全駕駛 一定藥知道



藥駕對交通安全的危害 超乎你我想像！

藥駕的危險不輸酒駕

↓ 服用特定藥品可能會引發的症狀 ↓



嗜睡



專注力及判斷力下降



疲勞



反應遲鈍



眩暈



視力模糊

小叮嚀



1. 購買藥品或看醫生時，應詢問是否會影響駕駛，勿自行判斷。
2. 駕駛前應避免服用引發上述症狀的藥品。
若無法避免，應請教醫師或藥師，選擇較不影響駕駛安全的藥品替代。

這些藥品 可能會影響駕駛安全



可能影響駕駛安全之藥品類別

安眠藥

麻醉藥

散瞳劑

肌肉鬆弛劑

部分特定抗精神病藥

部分特定抗焦慮藥

部分特定抗憂鬱藥

部分特定降血糖藥

部分特定降血壓藥

部分特定口服止痛藥

部分特定止咳感冒藥

來自藥師小叮嚀

民衆若有駕駛需求，應於就醫或購買上述藥品時，諮詢醫師或藥師下列事項：

1. 使用藥品後，**是否**可以駕駛。
2. 使用藥品後，**多久**可以駕駛。

清單外其它種類藥品

民衆應注意藥品仿單標示的相關警語及注意事項，其中包括對於操作機械能力（包含駕駛能力）的影響，若有任何疑慮請諮詢專業醫藥人員，以確保交通安全。



用藥謹慎 行車更安全



患有睡眠呼吸中止症、嗜睡或猝睡症、慢性失眠、心肺異常、疼痛症候群或精神疾病者，應諮詢醫生，是否適合駕駛。



剛開始服用可能引發鎮靜的藥品或調整劑量期間，應諮詢醫生或藥師，是否適合駕駛。

小叮嚀

喝酒、使用藥品、熬夜都會影響駕駛能力，請避免在熬夜後駕駛，亦不可酒駕、毒駕或藥駕。



高齡駕駛 的平安守則



若有駕駛需求，應事前向醫師或藥師諮詢所服用的藥品是否會影響駕駛安全。



動作遲緩、視力退化、青光眼、失智症、巴金森氏症等，可能會影響駕駛安全，應向醫生諮詢。

小叮嚀

75歲以上每3年要重新換發駕照，需經體檢合格，另需通過認知功能測驗，或檢附未患中度以上失智症證明。

